


**チャシブゴケ目 (Lecanorales) ダイダイゴケ科 (Teloschistaceae)
ダイダイゴケ亜科 (Caloplacoideae)**

イワダイダイゴケ属 (Oxneriopsis S.Y.Kondr. et al.)


分類：イワダイダイゴケ属は世界では3種からなる。

*イワダイダイゴケ属の種の特徴を以下にまとめた。*属タイプ種

イワダイダイゴケ属	地衣体, 厚み mm, 性状	下生菌糸	子器 mm	子嚢胞子, 室, 隔壁 μm	地衣体呈色反応	基物	分布帯
<i>O. oxneri</i> *トゲダイダイゴケ	黄緑~汚黄, 薄, 小区画, 裂芽<0.4	白	LC~B , 黄~橙褐, 無柄, 0.5-1.2, 油滴	無, 長円形, 分極2室, 13-18 x 6-7, 4-6	K+紫赤	樹	日, 冷温帯
<i>O. yeosuensis</i> イワダイダイゴケ	淡黄緑~明黄緑, 小区画 0.3-1.5	黒	LC~B , 暗黄褐~暗橙褐, 無柄, 0.5-1.5, 疣状縁, 油滴	無, 長円形, 分極2室, 13-17 x 8-9, 4-7	K+紫赤	岩	日; 韓, 温帯~熱帯
<i>O. taehaensis</i> シロフチイワダイダイゴケ	暗灰~灰緑, 疣状連続	欠/白	B , 暗黄~暗橙, 1.0-1.3, 油滴	無, 長円形, 分極2室, 15-19 x 8-10, 7-9	K+紫赤	海岸岩	日; 韓, 温帯



O. yeosuensis [3319]



O. taehaensis [3532]

文献：Kondratyuk S.Y., Lőkös L., Farkas E., Jang S.-H., Liu D., Halda J.P., Persson P.-E., Hansson M., Kärnefelt I., Thell A., Fačková Z., Yamamoto Y. & Hur J.-S. 2019. New and noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi 9. Acta Bot. Hung. 61: 325-367. [3532]

Kondratyuk S.Y., Lőkös L., Upreti D.K., Nayaka S., Mishra G.K., Ravera S., Jeong M.-H., Jang S.-H., Park J.S. & Hur J.-S. 2017. New monophyletic branches of the Teloschistaceae (lichen-forming Ascomycotina) proved by three gene phylogeny. Acta Botanica Hungarica 59: 71-136. [3255]

Kondratyuk S.Y., Lőkös L., Zarei-Darki B., Moniri M.H., Tchabanenko S.I., Galanina I., Yakovchenko L., Hooshmand F., Ezhkin A.K. & Hur J.-S. 2013. Five new *Caloplaca* species (Teloschistaceae, Ascomycota) from Asia. Acta Botanica Hungarica 55: 41-60. [3319]

Kondratyuk S., Søchting U. & Kärnefelt I. 1996. *Caloplaca oxneri* (Teloschistaceae), a new lichen species from East Asia. Nat. Hist. Res. 4: 17-20. [2059]